

Использование СИЗ: перчатки (стерильные, нестерильные), средств защиты лица и глаз; маски, респираторы, халаты.

Нормативные документы

ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского»		СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА	НОМЕР
НАЗВАНИЕ: «Использование СИЗ: перчатки (стерильные, нестерильные), средств защиты лица и глаз; маски, респираторы, халаты, униформа и обувь»			ВСЕГО 3 листов Версия 2
Действует с «__» _____ 202__ г.	ЗАМЕНЯЕТ:	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	
СОСТАВИЛИ: 1. Заведующая эпид. отделом Мамонтова Л.С. 2. Старшая сестра КДЦ Дубовик А.А..		СОГЛАСОВАНО: Заместитель главного врача _____ /Архипова Н.В./ Заместитель главного врача _____ /Капина О.В./ УТВЕРДИЛ: Главный врач _____ /Е.А. Тюхменев// «__» _____ 2025 г.	

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,

МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19»,

МУ 3.5.1.3674-20 «Обеззараживание рук медицинских работников и кожных покровов пациентов при оказании медицинской помощи»,

МР 3.5.1.0113-16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

Цель СОП

В целях соблюдения инфекционной безопасности при контакте с инфекционным пациентом, или пациентом с подозрением на инфекционное заболевание с воздушно-капельным, контактным путями передачи возбудителя. Для защиты медицинского работника от инфекционных аэрозолей, от воздействия химических, токсических веществ на организм, а также для профилактики внутрибольничного распространения инфекционного заболевания.

Материальное оснащение

Медработники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с результатами специальной оценки условий труда (СОУТ). На рабочем месте должен быть запас одноразовых перчаток и масок.

1. Одноразовый халат (комбинезон, одноразовый костюм, шапочка),
2. Маски защитные, респираторы (класс защиты FFP2, FFP3),

3. Очки защитные закрытые, экран защитный, щиток защитный лицевой,
4. Перчатки (нестерильные, стерильные),
5. Специальная закрытая обувь
3. Кожный антисептик,
4. Одноразовые салфетки (или ветошь), бумажные полотенца,
5. Ёмкость с дезинфицирующим раствором,
7. Ёмкости для сбора медицинских отходов класса А и класса Б.

Перчатки одноразовые медицинские надевают после проведения гигиенической (или хирургической) обработки рук, после полного высыхания антисептика на коже рук. При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин место повреждения заклеивается лейкопластырем.

После снятия перчаток необходимо провести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком.

Когда надевают медицинские перчатки

- во всех случаях, когда возможен контакт с кровью, другими биологическими субстратами,
- во время уборки помещений,
- при контакте со слизистыми оболочками;
- при контакте с поврежденной кожей;
- при контакте с агрессивными жидкостями;
- при использовании колющих и режущих инструментов;
- при проведении инвазивных диагностических и лечебных манипуляций.

Когда используются нестерильные перчатки

- при выполнении неинвазивных диагностических процедур,
- при выполнении внутрикожных, подкожных и внутримышечных инъекций,
- при выполнении катетеризации периферических вен, внутривенных вливаний, постановке периферического венозного катетера,
- при проведении нестерильных эндоскопических вмешательств,
- при работе в клинично-диагностических, бактериологических лабораториях,
- при обработке загрязненных медицинских инструментов и материалов.

Когда используются стерильные перчатки

- при выполнении всех видов оперативных вмешательств.
- при введении стерильного устройства в стерильные полости организма,
- при постановке центрального катетера,
- при постановке мочевого катетера
- при проведении стерильных эндоскопических вмешательств.

Когда используется одноразовая и многоразовая медицинская одежда

- Медицинский персонал должен работать в спец.одежде: халатах, медицинских костюмах, шапочках, специальной обуви.
- В операционных врачи и другие лица, участвующие в операции, должны работать в стерильных халатах и бахилах, специальной обуви, шапочках, перчатках и медицинских масках.
- Лица, присутствующие на операциях, но не участвующие в них, надевают одноразовую медицинскую одежду (одноразовые халаты, бахилы, шапочки, медицинские маски).
- При проведении операций, сопровождающихся образованием брызг крови, секретов, экскретов персонал надевает медицинские маски, приспособления для защиты глаз (очки, щитки). Предпочтение отдают средствам защиты однократного применения.
- При подготовке «стерильного стола» операционные медицинские сестры должны работать в стерильных халатах и бахилах, специальной обуви, шапочках, стерильных перчатках и медицинских масках.
- При постановке ЦКВ/ЦАК врачи должны работать в стерильных халатах и бахилах, специальной обуви, шапочках, стерильных перчатках и медицинских масках.
- При проведении перевязок ран используются одноразовые халаты, медицинские шапочки, маски, специальная обувь или бахилы, стерильные перчатки.

Как утилизировать спецодежду и СИЗ после применения

Перчатки одноразовые после использования обеззараживают и утилизируют как медицинские отходы класса Б.

Защитные маски одноразовые подлежат смене каждые 3 часа, после использования их обеззараживают и утилизируют как медицинские отходы класса Б.

Щитки, лицевые закрытые маски, пластиковые очки после использования обеззараживают в дез.растворе при полном погружении, выдерживают заданную экспозицию. Затем тщательно промывают под проточной водой и высушивают.

Одноразовые халаты, комбинезоны, костюмы, шапочки после применения следует погрузить в ёмкость с дезинфицирующим раствором как отходы класса Б.

Специальная обувь медработника должна быть с закрытым носком, выполнена из материалов, подвергающихся дезинфекционной обработке, иметь нескользящую подошву, не оставлять темных полос на полу, не создавать шума при ходьбе.

После контакта с инфекционным пациентом обувь следует двукратно обработать способом протирания одноразовой ветошью, смоченной в дезинфицирующем растворе. При обильном загрязнении рвотой, биологическими субстратами обувь необходимо продезинфицировать способом погружения в дезинфицирующий раствор, выдержать необходимую экспозицию и затем высушить.

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Подпись	Дата